

# OMEFORMULA 5

## Statut přípravku:

léčivý přípravek

## Balení:

10 nebo 50 ampulí obsahujících 2 ml roztoku.

## Složení:

*Aesculus hippocastanum*

*Arnica montana*

*Hamamelis virginiana*

*Urtica*

*Solidago virgaurea*

*Nicotiana tabacum*

*Hypericum perforatum*

*Collagenum*

*Aqua*

## Charakteristika:

Přípravek fyziologické regulační medicíny sloužící k podpoře léčby chronické venózní insuficience (poruše žilního odtoku z dolních končetin), ke zlepšení žilního tonu, úlevě od otoků dolních končetin a pocitu těžkých nohou. Složky přípravku mají vzájemně komplementární a synergické účinky:

Ovlivnění tonu a permeability cév, krevní cirkulace:

- zlepšení cévního tonu a stimulace žilního návratu (*Aesculus*, *Hamamelis*)
- snížení cévní permeability (*Arnica*, *Hamamelis*, *Solidago*)
- vazoprotektivní účinek (*Hamamelis*, *Solidago*), hemostatický účinek (*Urtica*).

Protizánětlivý účinek:

- modulační vaskulární fáze zánětu měkkých tkání
- analgetický účinek, působení proti vzniku ekchymóz (*Arnica*)
- působení proti vzniku žilních zánětů a jejich komplikací (flebitid, tromboflebitid, flebotrombóza) na podkladě žilní stázy (*Hamamelis*)
- působení proti rozvoji edémů vzniklých na podkladě zánětu žil (*Solidago*).

Zpevnění struktury cévní stěny, podpora hojivých procesů:

- zpevnění kolagenové složky stěny cév (kolagen)
- podpora hojení bérceových vředů (*Hypericum*).

Působení proti mikroangiopatiím:

- snížení pohotovosti k mikroangiospazmům prostřednictvím stimulace vláken hladkého svalstva v cévní stěně (*Nicotiana*)
- přímé spasmolytické působení na hladkou svalovinu cév (*Arnica*).

## Indikace:

Podpurná léčba chronické venózní insuficience.

## Kontraindikace:

Přecitlivělost na látky obsažené v přípravku.

## Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.




## Významné interakce:

Nejsou známy.

## Dávkování, způsob podání:

Aplikuje se na kůži dolních končetin (magnetoforézou /přístroj GUNAPHORESIS/, iontoforézou, pomocí ultrazvukového zařízení, elektroforézou, pomocí mikrojehel) do akupunkturálních bodů: slezina-pankreas 3/4/6/9/10, močový měchýř 58/60, játra 11 (viz obrázek).



Standardní protokol: 1-2 aplikace týdně po dobu 8-10 týdnů. Pro dlouhodobé působení se doporučují 1-2 aplikace jednou či dvakrát ročně.

## Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou dávku. Doba použitelnosti se vztahuje na uchovávání neporušeného balení přípravku při správné teplotě, tj. od 20 °C do 25 °C.

## Uchovávání:

Při pokojové teplotě do 25°C. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním světlem.

## Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:

GUNA, Via Palmanova 69, Milano, Itálie

## Informace o způsobu výdeje přípravku:

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis (dle § 8 odst. 3 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.)

## Informace o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

Není hrazen.